


Doppel-blinde, randomisierte, Placebo-kontrollierte, multizentrische Phase-III Studie zu Tafasitamab und Lenalidomid in Kombination mit R-CHOP versus Placebo Plus R-CHOP in Patienten mit neudiagnostiziertem Diffus Großzelligem B-Zell-Lymphom mit hoch-mittlerem und hohem Risiko



In Deutschland startet die Rekrutierung bald

Weiterführende Literatur

Salles G et al., Lancet Oncol. 2020; 21(7):978-988.

Primäre Analyse (Datenschnitt November 2018) der Phase II Studie von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid im R/R DLBCL (L-MIND).

[Link](#)

Düll J et al., Haematologica. 2021; 106(9):2417-2426.

Langzeitanalyse der Phase II Studie (L-MIND) von Tafasitamab plus Lenalidomid im R/R-DLBCL (Datenschnitt Oktober 2020)

[Link](#)

Belada D et al., J Clin Onc. 2021; 39(suppl. 15):7540.

Ergebnisse der Phase-Ib-Studie FirstMIND zur Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid plus R-CHOP bzw. Tafasitamab plus R-CHOP in der Erstlinientherapie des DLBCL: Abstract vom ASCO 2021

[Link](#)

Jurczak W et al., Blood.2019; 134 (Supplement-1):4078.

Poster vom ASH 2019, das die Langzeit Follow-Up Daten der Phase IIa Studie von Tafasitamab Monotherapie in R/R B Zell Non-Hodgkin Lymphom darstellt.

[Link](#)

* frontMIND ist eine Studie gesponsert von MorphoSys

Stand 05. Oktober 2021

DE/TAFACD19/NP/21/0078